

hemavit AD₃E+ 1 liter, 5 liter, 20 liter
FOLYÉKONY VITAMIN- ÉS NYOMELEMKIEGÉSZÍTŐ OLDAT

Összetétel (literenként)

Hatóanyag	Mennyiség
A vitamin	14 000 000 I.U.
D3 vitamin	200 000 I.U.
E vitamin	7 000 mg
B1 vitamin	200 mg
K3 vitamin	1 000 mg
C vitamin	3 000 mg
Cink (szulfát alak)	600 mg
Mangán (szulfát alak)	600 mg
Kobalt (klorid alak)	20 mg
Szelénium (szelenit alak)	10 mg
Lizin	5 000 mg
Metionin acetyl	5 000 mg

Célállat Baromfi, fácán, sertés, szarvasmarha, ló, nyúl

Hatása A készítmény előkészíti és optimalizálja az ivarérést, valamint a szaporodást. A növekedés kritikus szakaszaiban gondoskodik a létfontosságú elemek pótlásáról.

Előnyei Az A vitamin fontos szerepet játszik a szaporodási folyamatokban, a növekedésben, továbbá szükséges a hámsejtek fertőzésekkel szembeni ellenállóképeségének kialakításában. A D₃ vitamin egyik legfontosabb feladata a kalcium beledből történő felszívódásának és csontokba való beépülésének biztosítása. Az E vitamin pozitív hatással bír a baromfiak szaporodási folyamataira és a tojások keltethetőségére, de leglényegesebb a peroxidok elleni antioxidáns hatása. A B₁ vitamin a szénhidrátok felhasználását irányító enzimek felépítésében játszik fontos szerepet, de szükséges takarmányváltáskor is. A K₃ vitamin szabályozza a véralvadást, madaraknál pedig a vedlést segíti. A C-vitamin segíti a hám, a kötő és a porcanyagok képződését, javítja a hím állatok spermájának minőségét, és közreműködik a szervezet általános ellenálló képességének fokozásában is.

Javallat Az állatok növekedéséhez, fejlődéséhez, ivarzás előtt a szaporodási folyamatok elősegítéséhez, valamint a vemhesség időszakában, továbbá stresszhatások, vagy takarmányváltások alkalmával. **Napos korban és a vakcinázást követő időszakban mindig.** Angolkór, csontlágylás esetén, szelénhiány okozta izomelfajulás, vagy csibék ödémabetegségének és agylágylásának kezelésére, emellett a tojások falvastagságának növelésére és a keltethetőségének javítására.

Adagolás

Állatfaj	Adagolás módja	Napi mennyiség
Sertés	Vemhesség kezdetekor 5-10 napon át	30 ml
	Ellési területre helyezéskor 5 napon át	30 ml
	Elválasztás hetében 5 napon át	30 ml
Borjú	Havonta egyszer, 5 napon át	5-10 ml
Üsző	Legelőre hajtás, valamint szaporodás előtt	30 ml
Baromfi, fácán	Egymást követő 3-5 napon át	1 l/1 000 l (itatóvíz)
Bika	Havonta egyszer, 5 napon át	20-30 ml
	Havonta egyszer, 5 napon át	30-50 ml
	Minden nap	5 ml
Tejelő tehén	Termékenyítés, borjadzás után, 5 napon át	150 ml

Figyelmeztetés A készítmény alkalmazását mindenkor dokumentáljuk! **Óvakodjunk a túladagolástól!**

Mellékhatás nincs

Élmezés-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Tárolás Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 - 30 °C)
Minőségmegőrzési idő 18 hónap
Származás EU
Forgalmazza HeMA Magyarország Kft. www.hema.hu; hema@hema.hu;
T: 06 1 365 1196, F: 06 1 365 1197; α HU 20 2 0029