

hemavit Ferrit 1 liter, 5 liter, 20 liter VASHIÁNY MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE

ÖSSZETÉTEL (literenként)

Hatóanyag	Mennyiség
A vitamin	400 000 I.U.
D3 vitamin	20 000 I.U.
E vitamin	12 000 mg
Glicin (aminosav)	10 000 mg
Vas (szerves kötésben)	5 000 mg
Szelén (sodium selenit forma)	900 mg
Kobalt szulfát	30 mg
Fólsav	250 mg
Szőlőcukor (dextróz)	100 000 mg
Növényi kivonatok: encián, articsóka, fekete ribizli	

Célállat Sertés, malac, és minden olyan állat, amelynél a vashiány jelei mutatkoznak

Hatása A gyors növekedési korszakokban fokozott a szervezet vasszükséglete. A **hemavit Ferrit** tartalmazza mindazon vitaminokat, ásványi anyagokat és aminosavat, amelyekre a vashiányos betegségek, vagy vashiányos tünetek kezelése során a szervezetnek szüksége van. Elsősorban az energiaforgalomban játszanak szerepet a vastartalmú enzimek, míg a vérplazmában egy speciális szállítófehérjéhez kötve található meg. Az aktív vas kb. 80%-a a vörösvértestek hemoglobinjában (oxigént szállító, vastartalmú fehérje), közel 20%-a pedig a mioglobinban (az izomban levő, fehérje tartalmú festékben) található. Az ideális körülmények között született malacok szervezetében is legfeljebb csak két hétre elegendő vas van. Szükségeinek mindössze 1/7-t fedezi a kocatejben található vas. **A vashiány leggyakoribb tünetei** a ráncolt, sápadt bőrű, levert, étvágytalan, fizikailag alig vagy nem terhelhető állat, és a rühösség.

Előnyei A megnövelt mennyiségű A-, D3-, és E vitamin, a dextróz, valamint a fólsav megkönnyíti a hozzáadott vas gyors felszívódását. A nagymennyiségű szőlőcukor gyors segítséget ad az izmok és az idegrendszer terhelhetőségének helyreállításában.

Javallat A fialást megelőző kritikus időszakban, valamint az újszülött és a választási malacok vashiányos tüneteinek a kezelésére. A vashiány első tünetei leggyakrabban 2-3 hetes életkorban jelentkeznek, azonban ha a koca vasellátása is hiányos volt, akkor ennél előbb is kialakulhat.

Adagolás

Állatfaj	Mennyiség
Sertés	30 ml/sertés/nap 4 napon át, 4 héttel a fialás előtt
Malac (2 - 3 napos kortól)	5 ml/malac, 5-7 napon át elválasztáskor 10 napon át

Mellékhatás nincs

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Tárolás Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 - 30 °C)
Minőségmegőrzési idő 18 hónap
Származás EU
Forgalmazza HeMA Magyarország Kft. www.hema.hu; hema@hema.hu;
 T: 06 1 365 1196, F: 06 1 365 1197; α HU 20 2 0029